




Reinigungs- und Desinfektionsplan

zusätzliche Maßnahmen bei Durchfallerkrankungen (incl. Norovirus)

Hohenzollern-KiTa der htw und der AWO

	WAS	PRODUKT	DOSIERUNG	WIE	WIE OFT	Bemerkung
	Hände	AHD 2000	Pur ca. 3ml	Hände wie erlernt 30 sek. feuchthalten	Händedes-infektion möglichst häufig durchführen	nach Toilettengang, vor Essensausgabe, nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten
	Spielsachen	Incidin pro	1,5 % = 60 ml / 4 l kaltes Wasser, EWZ 30 min. inkl. Norovirus	auf Tuch geben, abwaschen	täglich	nach Möglichkeit Spielzeugbenutzung einschränken
	Wickelauflage	Decawipes XL N	pur EWZ 30 min. inkl. Noro-Virus	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	nach jeder Benutzung. **15 Min. Einwirkzeit**	zusätzlich Einwegunterlage verwenden
	Türgriffe,Handläufe, Lichtschalter ähnliche Kontaktflächen	Decawipes XL N	pur EWZ 30 min. inkl. Noro-Virus	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	nach Möglichkeit mehrfach täglich	30 min. Einwirkzeit
	WC	Incidin pro	1,5 % = 60 ml / 4 l kaltes Wasser, EWZ 30 min. inkl. Norovirus	abwaschen	täglich und nach Bedarf	30 min. Einwirkzeit
	übriger Sanitärbereich	Incidin pro	1,5 % = 60 ml / 4 l kaltes Wasser, EWZ 30 min. inkl. Norovirus	abwaschen	täglich und nach Bedarf	30 min. Einwirkzeit
	Böden	Incidin pro	1,5 % = 60 ml / 4 l kaltes Wasser, EWZ 30 min. inkl. Norovirus	nasswischen 1-stufig	täglich	30 min. Einwirkzeit
	Reinigungs-Textilien	Medisoft Safe Desinfektions-waschmittel	2 g/l (Flotten-verhältnis 1:5) enspricht ca. 30 g /kg Wäsche	60°C (RKI A&B)	nach Benutzung	Textilien großzügig wechseln

Die Anwendungshinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Originalgebinde sowie im Produktblatt und im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten!

Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann !

Die R&D-Pläne sind vom Hygieneverantwortlichen der Einrichtung zu prüfen und freizugeben.